Une paraplégie évolutive d'installation rapide

Staff Pinel 11.06.2015

ANTÉCÉDENTS

- Homme de 69 ans
- Peintre en bâtiment
- Tabagisme sevré à 60 PA
- Carcinome épidermoïde peu différencié pulmonaire, métastatique d'emblée (T8/T11/T12, épидurite T11, foie), diagnostiqué en Juin 2012
 - Biopsie + fixation T11
 - Radiothérapie rachidienne : 16 Gy en 2 séances en Août 2012
 - Chimiothérapie par Carboplatine/Taxol (5 cures) puis Carboplatine jusqu'en Mai 2014 (25 cures)
 - Nouvelles lésions en Juin 2014 : sacro-iliaque et C2
 - Navelbine (RCP du 17/06/2014)
- Rosacée, sciatique.

HISTOIRE DE LA MALADIE

- 01/07/2014 : Installation en 4 heures d'une paraparésie flasque + dysurie. Syndrome fébrile 38,9°C.

CH_PITIE_SA

[01/1

TR

Résolu

DFOV 3

LCR

- 02/07 : 40 cellules dont 90% de PNN, 25 hématies, PCR virales négatives, protéinorachie 1,59 g/l, glycorachie 2,6 mmol/l, pas de cellules anormales.
- 03/07 : 22 cellules, 17 hématies, PCR virales négatives, BOC négatives, protéinorachie 1,25 g/l, glycorachie 3,0 mmol/l (glycémie 13,2 mmol/l), pas de cellules anormales.

HISTOIRE DE LA MALADIE

- Aggravation rapide en 24 heures :
 - Atteinte des MS
 - Dysarthrie
- Examen clinique :
 - Conscient, vigilant
 - Tétraplégie flasque, ROT conservés, Babinski gauche
 - Pas de niveau sensitif
 - Dysarthrie d'allure cérébelleuse, nystagmus multidirectionnel
 - Dysphagie + encombrement bronchique
- Puis à J3 : transfert en réanimation, intubation oro-trachéale, ventilation mécanique

JY,
1

SAR

GE MEDICAL SYS
UY,
SYS#MR₁

SAR

GE MEDICAL SYS
SYS#MR

LCR

- 08/07 : pas de cellules, 6 hématies, PCR virales négatives, protéinorachie 2,47 g/l, glycorachie 5,1 mmol/l, pas de cellules anormales.

BILAN IMMUNOLOGIQUE ET INFECTIEUX

- GB 19900/mm³, PNN 17830/mm³
- CRP 138 mg/l, PCT négative
- BK négatif dans LBA, LCR
- Parasitologie négative dans LBA, LCR
- FAN, ANCA négatifs
- **Anticorps anti-AQP4 négatifs**
- Sérologie toxocarose négative
- Sérologie toxoplasmose en faveur d'une infection ancienne
- Lyme négatif
- Mycoplasme, Chlamydiae négatifs
- Brucellose négatif
- Syphilis négatif
- ECA normale
- B12 normale
- Sérologies VIH/VHB/VHC négatives
- **Anticorps antineuronaux et antineuropiles négatifs**

EVOLUTION

- Dix bolus de corticoïdes d'1 g + IgIV 2g/kg
- Poursuite de l'aggravation + Pneumopathie hypoxémiante à enterobacter aerogenes
- Arrêt des soins puis décès le 17/07
- Autopsie

Poids : 1424 g

Moelle - Luxol

Moelle – HE

Moelle – MBP/NF

MBP : Marron
NF : Rouge

Moelle – CD68 et C9

Moelle – CD3 et CD20

Bulbe – MBP-NF

Bulbe – MBP/NF

MBP : Marron
NF : Rouge

Bulbe – CD68 et C9

Chiasma/NO – HE

Chiasma/NO – CD68

Bulbe

GFAP : Marron
AQP4 : Rouge

MYÉLITE NÉCROSANTE PARANÉOPLASIQUE

- Evolution (sub)aiguë
- Moelle cervico-thoracique > lombaire
- Débute par une paraplégie flasque + troubles fonctionnels urinaires (>90% des cas)
- IRM médullaire : hypersignal T2 étendu plutôt centro-médullaire avec œdème. Hypersignal T1 Gadolinium hétérogène non systématique.
- Anatomico-pathologie : nécrose, infiltration macrophagique, et lymphocytaire à moindre degré. Infiltration lymphocytaire vasculaire possible.
- Quelques cas avec anti-NMO positifs

MYÉLITE NÉCROSANTE PARANÉOPLASIQUE

TABLE 1. Classification of Spinal Cord Lesions in Cancer Patients^{1,2}

1. Metastatic disease
2. Lesions due to therapy
 - Radiation myelopathy
 - Lesions associated with chemotherapy
 - Miscellaneous
3. Opportunistic infections
4. Paraneoplastic syndromes
 - Necrotizing myelopathy
 - Motor neurone disease
 - Long tract degeneration
 - Encephalomyelopathy
5. Nutritional myelopathy
6. Miscellaneous

TABLE 5. Paraneoplastic Necrotizing Myelopathy: Summary of 24 Cases*

Age/sex		
Less than 30 years	4 cases	Mean age, 47 years Median age, 55 years Range age, 16–77 years Mid-range, 46.5 years
31–50 years	7 cases	
51–60 years	5 cases	
61 and more years	8 cases	
Associated malignancy		
Malignant lymphoma/ leukemia	8 cases	
Carcinoma lung	6 cases	
Carcinoma breast	3 cases	
Carcinoma prostate	2 cases	
Miscellaneous	5 cases	
Survival after paraplegia		
Less than 14 days	4 cases	Mean survival, 43 days Range, 5–150 days Mid-range, 77.5 days Median, 30 days
15–30 days	8 cases	
31–60 days	9 cases	
61 and more days	3 cases	

* 13 males & 11 females.

MERCI DE VOTRE ATTENTION