



## INFECTIONS GENITALES HAUTES

### GERMES EN CAUSE

- Chlamydia trachomatis : 40 à 60 %
- Entérobactéries : E. coli : 20 à 30%
- Streptocoque : 10 à 30 %
- Anaérobies
- Mycoplasme
- Staphylocoques

Infections généralement pluri microbiennes

### EXPLORATIONS

#### - *Prélèvements bactériologiques :*

- P vaginal
- P endocol standard (sur un endocol hors grossesse la recherche de gonocoque est incluse)
- recherche de chlamydia par PCR endocol ou dans les urines (milieu de conservation au congélateur)

#### - *Autres prélèvements :*

- NFS + plaquettes (+/- TP, TCA, fibrinogène, groupe RAI pour bilan pré opératoire)
- CRP
- B-hCG ou test immunologique de grossesse
- Sérologies HIV, hépatites B et C, TPHA-VDRL
- ± Hémocultures (si T  $\geq$  38°)
- BU  $\pm$  ECBU

- **FCV** si ancien (mais existence de faux positifs en période infectieuse)

- **Echographie pelvienne** : recherche de complications : pyosalpinx, abcès de l'ovaire ou du Douglas

### **MODALITES DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE**

- En première intention : bi antibiothérapie parentérale probabiliste **maintenue 48 heures après obtention de l'apyrexie + relais après 48 h de traitement IV :**

- Augmentin ® : 1 g x 3/ jour IV + Oflocet ® : 200 mg x 2/jour IV
- Si allergie à la pénicilline : Dalacine ® : 600 mg x 3 /jour IV + Oflocet ® : 200 mg x 2/jour IV

- **Puis adapté au germe et à l'antibiogramme per os :**

- Chlamydia, ou pas de germe : Augmentin® : 1 g x 3/jour pour compléter 15 jours  
+ Oflozet ® : 200 mg x 2/jour pour compléter 3 semaines de traitement
- Entérobactérie : Augmentin® : 1 g x 3/jour pour compléter 15 jours
- Gonocoque : Oroken® : 200 mg x 2/jour pour compléter 15 jours ou  
Rocéphine® : 500 mg IM (traitement monoprise)
- Anaérobie : Flagyl® : 500 mg x 3/ jours pendant 15 jours

## **SURVEILLANCE**

- Examen clinique : douleurs et fièvre
- Biologique : NFS + plaquettes et CRP à J3
- Consultation 3 semaines après le début du traitement (+/- contrôle bactériologique, FCV et sérologies si non fait)

## **PRISE EN CHARGE DU (DES) PARTENAIRE(S)**

- ECBU avec recherche de chlamydia par PCR sur urines
- Traitement antibiotique : Zithromax monodose® 1gr en 1 seule prise

CAT

