


Préambule

Ce document a été préparé à partir d'éléments puisés aux meilleures sources, notamment le Dictionnaire des spécialités Vidal et «la carte de soins et d'urgence» établie par le Ministère de la santé avec le concours de l'AFM, pour les patients.

Il comprend deux parties :

- ◆ Pour les principes actifs nous avons généralement adopté la DCI ou dénomination commune internationale.
- ◆ La deuxième partie a vocation à faciliter le repérage des principes actifs grâce à un classement alphabétique.

ATTENTION ! Bien que ces listes soient très complètes, elles ne prétendent pas être exhaustives ni se substituer à l'avis des spécialistes.



Association des Myasthéniques
Isolés et Solidaires

Web : www.myasthenie.com
Mail : association.amis@laposte.net

Membre d'Euro Myasthenia Gravis Association


Siège social : 4 impasse des marcassins
60520 La Chapelle en Serval

Version 1.05f- mai 2012

Pour obtenir la dernière version mise à jour
connectez-vous sur


<http://myasthenie.com/ftp/pub/listes%20medicaments/>

Ou scannez le QR code ci-dessous



Information sur les médicaments à utiliser avec précaution par les myasthéniques

Partie I
**Liste par grandes
familles thérapeutiques**



Les principes actifs formellement contre-indiqués sont en caractères gras, les autres sont à utiliser avec précaution.

Anesthésiques

- Curarisants
 - **Atracurium, Cisatracurium, Mivacurium, Pancuronium, Rocuronium, Vécuronium**
- Anesthésiques volatils (par inhalation)
 - Sévoflurane, Mono et Protoxyde d'azote
- Barbituriques IM ou IV (IntraMusculaire ou IntraVeineux)
 - Phénobarbital, Thiopental
- Autres anesthésiques non barbituriques
 - Kétamine, Propanidide, Procaïne

Antibiotiques

- Aminosides parentéraux ou en application locale
 - **Néomycine, gentamicine, nétilmicine, sisomicine, tobramycine, kanamycine ...** (traces dans les vaccins)
- Polymyxines polypeptides par voie systémique ou en application locale
 - **Colistine, Polymyxine B**
- Cyclines injectables
 - **Tigécycline**
- Macrolides et apparentés
 - **Telithromycine, Lincomycine, Clindamycine**
- Fluoroquinolones
 - Ciprofloxacine, Levofloxacine, Moxifloxacine, Ofloxacine, Pefloxacine

Il faut interroger le médecin spécialiste avant l'arrêt d'un traitement ou la prise d'un nouveau médicament même s'il ne se trouve pas sur les listes.

Cardiovasculaires

- Antiarythmiques
 - Groupe I :
 - **Quinidine, Hydroquinidine, Procaïnamide, Propafenone, Lidocaïne** en IV (intraveineux)
 - Groupe II : Béta-bloquants
 - **Acébutolol, Aténolol, Bétatop Gé, Métoprolol, Nadolol, Oxprénolol, Pindolol, Propanolol, Sotalol**
 - Groupe IV : Inhibiteurs calciques
 - Diltiazem, Vérapamil, Nifédipine
- Anticoagulants - Antiagrégants plaquettaires
 - Dipyridamole

Neurologie-SNC

- Myorelaxants—Antiépileptiques
 - **Diphénylhydantoïne ou Phénytoïne, Dantrolène, Baclofène, Carbamazépine, Clonazépam, Méphénésine, Méthocarbamol, Tétrazépam**
- Antihistaminiques - Antiallergiques
 - Alimémazine, Bromphéniramine, Chlorphénamine, Dexchlorphéniramine, Diphénhydramine, Doxylamine, Hydroxyzine, Meclozine, Méquitazine, Oxatomide, Oxoméazine, Phéniramine, Phényltoxicamine, Pizotifène, Prométhazine
- Anxiolytiques - Benzodiazépines
 - **Alprazolam, Bromazépam, Clidinium, Chlordiazépoxyde, Clobazam, Clorazépate, Clotiazépam, Diazépam, Etifoxine, Loflazépate, Lorazépam, Nordazépam, Oxazépam, Prazépam,**
- Hypnotiques - Benzodiazépines et dérivés
 - Estazolam, Flunitrazépam, Loprazolam, Midazolam, Nitrazépam, Témazépam, Zopliclone
- Psycholeptiques - Neuroleptiques
 - Chlorpromazine, Fluphénazine, Lévomépromazine, Lithium

Ophtalmologie

- Béta-bloquants en collyre
 - **Bétaxolol, Cartéolol, Timolol, Timolol combiné**

Produits de diagnostic

- Produits de contraste injectables pour imagerie médicale
 - Iode, Gadopentétate de méglumine
- Explorations fonctionnelles cardiovasculaires
 - Dipyridamole injectable

Vaccins vivants

- **Polio orale, Rougeole, Rubéole, Fièvre jaune ...**
en cas de traitement immunosuppresseur

Divers

- Antipaludéens
 - **Chloroquine, Halofantrine, Méfloquine, Quinine, Quinidine**
- Rhumatologie
 - **D-Pénicillamine**
- Urologie, vessie instable
 - **Oxybutinine**
- Apports magnésien en IV
 - **Pidolate de Mg, Sulfate de Mg**
- Gastroentérologie
 - Magnésium voie orale
- Immunomodulateurs
 - Interféron alpha
- Immunosuppresseurs et anti-inflammatoires
 - Corticoïdes en début de traitement
- Dépendance à la nicotine
 - Patch nicotinique
- Alcaloïdes de quinquina
 - Schweppes et boissons à alcaloïdes apparentés à la quinine

Seul le médecin est apte à juger du bien-fondé de l'usage d'un médicament et à évaluer le rapport