

<p>GRUPE HOSPITALIER PITIE SALPETRIERE Service de gynécologie Obstétrique Professeur M DOMMERGUES</p>	<p>Auteurs : Marc DOMMERGUES (GO) Danièle VAUTHIER BROUZES (GO) Laura DUMITRU (AR) Laurence DUBOIS (AR) Odile PHILIPPON (SF) Date rédaction : janvier 2008 Date révision : Septembre 2011 Octobre 2017/ Mars 2018</p>
<p>INTERRUPTION MEDICALE DE GROSSESSE 1^{er} TRIMESTRE ≤ 14 SA : technique</p>	

J1 : Mifépristone (Mifégyne®) 1 cp (200 mg)

J2 : Si pose de Dilapans hospitalisation vers 17-18 h salle Levret à privilégier. Terme proche de 14SA, nullipare, utérus cicatriciel (cf. fiche récapitulative IMG insérée dans l'observation médicale et fiche de prescription).

Prévenir l'interne de garde à l'arrivée de la patiente dans le secteur d'hospitalisation

- **19-20h** : prémédication par Tramadol® 50LP : 1 comprimé + Paracétamol 1g per os et Alprazolam (Xanax®) 0.25 mg
- **Délai d'action minimum : 1 heure**
- **21-22h** : Pose de Dilapan® (2-4 Dilapans® + « tampon » vaginal)

J3 : Si pas de pose de DILAPANS prévue, hospitalisation secteur chirurgie ambulatoire à 7h30 à jeun :

- **Pour toutes les femmes**
- **A 7 heures** : Prémédication per os : cf prescription de l'Anesthésiste (pour information : Paracétamol 1 gramme + Ibuprofène 400mg)

A 8 heures : Misoprostol (Gymiso®) 2 cp voie vaginale ou par voie Orale (si Dilapans)

Si hospitalisation salle Levret: prévenir le bloc opératoire en joignant personnellement la surveillante (ou sa remplaçante) en appelant le 77691 pour donner l'horaire de prise du Misoprostol (Gymiso®) afin de programmer effectivement l'heure de passage au bloc opératoire (maximum 2 heures après prise de Gymiso® ou avant si contractions utérines douloureuse mal tolérées) pour aspiration du contenu utérin.

- **Si expulsion spontanée** : révision utérine au bloc si persistance d'un résidu ou si saignements anormaux. (Vérification de la vacuité utérine à l'échographie)
- Si nécessité d'une expulsion voie basse pour examen foetopathologique : Pose de DILAPANS. Analgésie péridurale, rupture des membranes +++ le plus rapidement possible dès que l'orifice interne du col est perméable dès l'ablation des Dilapans et Gymiso® 2cp voie vaginale / 4 heures. Révision utérine au bloc sous échographie (antibiothérapie selon protocole)
- Contre indication au misoprostol (Gymiso®) : Allergie aux prostaglandines