

GROUPE HOSPITALIER PITIE SALPETRIERE Service de gynécologie Obstétrique Professeur DOMMERGUES	Auteurs : M DOMMERGUES (GO) D VAUTHIER (GO) Validé par : F TANKERE (service ORL) Date rédaction : février 2015 Date révision :
PARALYSIE FACIALE en cours de GROSSESSE	

Diagnostic de paralysie faciale périphérique

Le diagnostic repose sur la clinique

Atteinte du facial supérieur et inférieur

Pas d'autre signe neurologique : pas d'autre déficit moteur, pas d'atteinte d'autre paire crânienne, pas de trouble visuel, pas de céphalée, pas d'aphasie, pas de trouble de l'équilibre, pas de syndrome méningé, pas de vomissements. Pas de fièvre

Présence fréquente d'otalgies ou de douleurs rétro-auriculaires homolatérales et de troubles du goût.

Rechercher des vésicules sur le pavillon de l'oreille qui signerait une origine zostérienne (le traitement sera identique).

En cas de doute : appel neurologue de garde (tel XXX) ou urgences cérébrovasculaires (XXX)

Une fois le diagnostic posé, la prise en charge est urgente, dans le service d'ORL

Dans la semaine :

FAX ORL 63134

Tel ORL 63162

Le weekend:

L'interne est présent le samedi et le dimanche matin. Pour les après-midi, la prise en charge en ORL peut attendre le lendemain.

FAX ORL: 63121

DECT interne : 63119

Dans l'attente de la consultation d'ORL, qui a lieu le jour même ou le premier jour ouvré suivant

Bilan étiologique

Sérologie lyme, HSV, VZV et VIH + bilan pré corticoïdes forte dose (NFS CRP IONO CREAT)

IRM cérébrale et cervico-faciale avec injection explorant l'ensemble du trajet du nerf facial du tronc cérébral à la parotide incluse. L'IRM peut être différée chez les femmes enceintes et attendre 32SA (ou le post-partum).

Traitement

A débiter dès que le diagnostic de paralysie faciale périphérique est posé :

- Zelitrex 500mg x 6/j 7jours
- Cortancyl per os 1 /kg/J x 7 jours OU si patiente hospitalisée : Solumédrol : 1mg/Kg/j en une injection le matin
- +/- Inexium 40 mg/j
- Larmes artificielles 6 à 10 fois par jour
- occlusion palpébrale nocturne en appliquant un sparadrap hypoallergénique **horizontalement** sur la paupière supérieure