



Interactions médicamenteuses, contre-indications et précaution d'emploi dans les syndromes du QT long familial (dont le syndrome d'Andersen)

Les médicaments contre-indiqués sont ceux pour lesquels des torsades de pointes ont pu être documentées. Les médicaments déconseillés ou à utiliser avec précautions sont les substances qui ne sont pas électrophysiologiquement neutres. Pour des raisons pharmacodynamiques ou du fait de leur appartenance à une famille ou une classe thérapeutique, il vaut mieux les éviter ou ne les prescrire que sous stricte surveillance électrocardiographique.

A – MEDICAMENTS CARDIOVASCULAIRES

- 1 - Antiarythmiques de classe I
 - **Contre-indiqués :**
Quinidine (CardioquineR, LongacorR, QuiniduruleR, SerecorR)
Disopyramide (RythmodanR, IsorythmR)
 - **Déconseillés :**
Cibenzoline (CipralanR, ExacorR)
Flécaïnide (FlecaïneR)
Propafénone (RythmolR)

La Méxilétiline (MéxitiilR) La Lidocaïne (XylocaïneR) et l'Aprindine (FiboranR) sont des antiarythmiques de classe Ib qui ont plutôt tendance à réduire l'intervalle QT, qui ne sont donc théoriquement pas nocifs et parfois peuvent être bénéfiques mais qui ne doivent être utilisés que sous surveillance spécialisée

-
- 2 – Antiarythmiques de classe III
 - **Contre-indiqués :**
Amiodarone (CordaroneR, CorbionaxR)
Sotalol (SotalexR)

-
- 3 – Inhibiteurs calciques
 - **Contre-indiqués :**
Bépridil (CordiumR)
-

- 4 – Diurétiques
 - **Contre-indiqués :**
Tous les diurétiques hypokaliémiants
-

- 5 – Vasodilatateurs cérébraux
 - **Contre-indiqués :**
Les dérivés de la Vincamine : OxovincinR , PervincamineR , VincinR , VincinforR VincimaxR , RhéobralR , RutovincinR , VincinrutineR)
-

B – LES PSYCHOTROPES

- **Contre-indiqués :**
Neuroleptiques :
Chlorpromazine (LargactylR, Droperidol (DroleptanR), Halopéridol (HaldolR)
Sultopride (BarnétylR) Thioridazine (MellerilR)

Antidépresseurs :
Imipramine (TofranilR, Désipramine (PertofranR) Amitépyline (LaroxylR, ElavilR) ,
Doxépine (QuitaxonR) , Maprotiline (LudimilR)
 - **Déconseillés :**
Tous les médicaments de la famille des phénothiazines, des butyrophénones, des benzamides, des imipraminiques, le lithium.
-

C – LES ANTI-INFECTIEUX

- **Contre-indiqués :**
Erythromycine (ErythrocinR, AbbotcinR, PropiocrinR, EryR+, ErypharR) et
Amphotéricine B (FungizoneR , AmphocyclineR)
Triméthoprime Sulfaméthoxazole (Bactrim R, Eusaprim R)
Amantidine (Mantadix R)
Pentamidine (Pentacarinat R)
Chloroquine (NivaquineR), Halofantrine (HalfanR)

Azolés : Kétoconazole (NizoralR), Miconazole (Daktarin R), Itraconazole (Sporanox R)
- **Déconseillés :**
Tous les macrolides, Quinine (Quinamax R, Quinoforme R), Mefloquine (LariamR) ,
Amodiaquine (Flavoquine R)

D - ALLERGOLOGIE

- **Contre-indiqués :**

Antihistaminiques H1 et non anticholinergiques : Astémizole (HismanalR)
Terfénaire (TeldaneR)

- **Déconseillés :**

Les autres antihistaminiques H1 non anticholinergiques :

Cétirizine (ZyrtecR, VirlixR), Laratidine (ClarityneR), Oxatomide (TinsetR)

Les antihistaminiques anticholinergiques :

Hydroxyzine (AtaraxR), Cyproheptadine (PériactineR), Prométazine (PhénerganR),
Dexchlorophéniramine (PolaramineR), Alimémazine (ThéralèneR), Tripolidine
(ActidilonR), Méfénidramium (AllergaR), Carboxinamine (AllergafonR), Buclizine

(AliphanR), Brophéniramine (DiméganR), Méquitazine (PrimalanR), Histapyrrodine
(DomistanR), Doxylamine (MéréprineR)

Les produits classés dans les « décongestionnants »

qui contiennent des antihistaminiques, exemples : ActifedR , DenoralR , BénadrylR ,
RinurelR , Clarinase R, Fervex R, Rhinofébral R, Rinutan R , Rupton R, Rumicine R,
Sup-Rhinite R, Triaminic R ...

CENTRE DE REFERENCE DES CANALOPATHIES MUSCULAIRES

Coordonnateur : **Pr B. FONTAINE** Médecin Responsable : **Dr S. VICART** Secrétaire : **Mme V. TOUZARD**
Téléphone : 01 42 16 16 91 - Fax : 01 42 16 19 27